



# DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI PER DIRIGENTE PSICOLOGO - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

- 1) **S.H. Foulkes teorizza i concetti di:**
  - A Matrice fondamentale o di base, matrice dinamica e matrice personale.
  - B Campo psicologico, gruppo sociale.
  - C Attacco e fuga, interdipendenza e interconnessione a grappolo (mutuati da Bion).
  - D Psicoeducazione in gruppo e Mentalità di gruppo.
- 2) **Il signor Verdi soffre di un carcinoma prostatico. Nel quadro della chemioterapia si sottopone a colloqui di consulenza psicologica. Ogni tre mesi gli viene somministrato il BDI (versione italiana) allo scopo di monitorare i suoi sintomi depressivi. I valori riportati nelle ultime tre misurazioni sono i seguenti: 31/01: Globale 93; somatico-affettivo 93; cognitivo 92; 30/04: Globale 89; somatico-affettivo 88; cognitivo 89; 31/07: Globale 87; somatico-affettivo 87; cognitivo 88; Quali di queste affermazioni sono corrette:**
  - A I punteggi vanno valutati tenendo conto della regressione verso la media.
  - B I dati indicano un netto miglioramento della sintomatologia.
  - C E' errato utilizzare il BDI in questo contesto.
  - D Il miglioramento dei sintomi può essere ricondotto all'intervento psicologico.
- 3) **Secondo le principali linee guida (p.e. NICE oppure NHRMC) i pazienti oncologici:**
  - A Devono sottoporsi in linea di principio ad uno screening psicologico.
  - B Devono essere informati sugli aspetti psicosociali della malattia.
  - C Devono ricevere un trattamento psichiatrico.
  - D Devono ricevere un trattamento psicoterapeutico.
- 4) **La specificità di un test indica:**
  - A La quota delle persone non affette, che vengono classificate dal test come tali.
  - B La quota delle persone affette, che vengono identificate dallo screening correttamente come tali.
  - C L'aumento relativo della quota di identificazione di persone affette rispetto alla pura quota casuale.
  - D La probabilità di non essere effettivamente affetto, nel caso di un risultato negativo.
- 5) **Nel "Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy: rapid review and case studies from Member States" - WHO Regional Office for Europe (2016):**
  - A Si è preso atto che una piccola percentuale variabile delle donne europee in gravidanza (dall'1% della Svezia al 3% dell'Irlanda) continua a consumare alcol nonostante sia a conoscenza degli effetti nocivi che provoca sulla salute del nascituro (a livello cerebrale e sui tessuti in quanto interferisce sui normali processi di sviluppo fisico e intellettuale).
  - B Sono state individuate le linee guida a livello europeo sul consumo di alcol "low risk" (a basso rischio) che devono essere applicate alla gravidanza.
  - C Il 9 settembre è stato indicato come "FASD Awareness Day" per diffondere la consapevolezza su questo tema nel mondo.
  - D La FASD è prevenibile al 100% se si modera il consumo di bevande alcoliche in gravidanza entro una UA (Unità Alcolica) al giorno.
- 6) **Il Lausanne Trilogue Play prevede che:**
  - A Alla famiglia viene proposto un gioco di ruolo in cui i genitori devono rispondere mettendosi nei panni l'uno dell'altro mentre il figlio deve interpretare uno dei due genitori.
  - B Alla famiglia venga proposto un gioco con delle regole esplicitate nella consegna.
  - C Alla famiglia viene proposto un gioco le cui regole devono essere stabilite dai genitori.
  - D Genitori e figli cooperino nel produrre un disegno che illustra la famiglia durante un avvenimento importante per la propria storia, scelta dal figlio.
- 7) **In caso di maxi-catastrofi:**
  - A Non sono previsti interventi psicosociali perché è prioritaria la messa in sicurezza delle persone.
  - B E' previsto che gli psicologi del CSM si rendano disponibili per attivare le TTP (tende per il triage psicosociale) vicino all'ospedale di campo.
  - C E' previsto che il Dipartimento per la Protezione Civile invii équipe specializzate sul posto, che assumono la piena responsabilità ed organizzazione di tutti gli interventi psicosociali.
  - D E' previsto che si costituiscano le EPE (équipe psicosociale per le emergenze), per il supporto psicosociale alla popolazione colpita da calamità.





- 8) **Nei Bing Eating Disorders (BED), il soggetto:**  
A Presenta crisi bulimiche senza condotte compensatorie ed eliminatorie, in presenza di sovrappeso, a diversi livelli di obesità.  
B Ingerisce grandi quantità di cibo per poi indursi il vomito.  
C Mastica e sputa ripetutamente senza deglutire, grandi quantità di cibo.  
D Rifiuta il cibo costantemente sino a giungere a stati cachettici.
- 9) **Il BDI II è:**  
A Un questionario che misura la presenza di disturbi dell'umore (maniacale, depressivo, misto).  
B Un test per valutare i disturbi di personalità del Cluster A.  
C Un questionario per valutare la presenza e l'intensità dei sintomi depressivi nelle ultime due settimane.  
D Un test per valutare i disturbi di personalità del Cluster B.
- 10) **Le Aziende Sanitarie Locali sono state previste per la prima volta:**  
A Dalla legge 502/1992.  
B Dal D.Lgs. 229/1999.  
C Dalla Legge 833/1978.  
D Dalla Legge 328/2000.
- 11) **La legge 194/78 prevede che in caso di richiesta di IVG in minorenne:**  
A Sia obbligatorio il parere positivo del Giudice Tutelare.  
B Sia sufficiente la richiesta da parte della ragazza, se minorenne emancipata, in virtù del diritto inviolabile all'autodeterminazione della donna.  
C Sia obbligatorio il parere dei genitori.  
D Sia obbligatorio l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza di questo, del Giudice Tutelare.
- 12) **Nell'ambito dell'organizzazione di un'Azienda Sanitaria Locale, per "Cure Primarie" si intende:**  
A L'assistenza sanitaria rivolta alle fasce primarie di età, ovvero infanzia e adolescenza.  
B I servizi per l'età evolutiva, che devono garantire i percorsi nascita e l'assistenza prenatale, neonatale e perinatale.  
C L'assistenza sanitaria di base, erogata dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.  
D I poliambulatori specialistici del Distretto Sanitario, punto di accesso per i cittadini all'assistenza sanitaria.
- 13) **Un soggetto con disturbo narcisistico di personalità presenta:**  
A Paura dei rapporti con gli altri.  
B Grande ricerca di attenzioni, teatralità ed espressione esagerata delle emozioni.  
C Forte impulsività, irritabilità, aggressività e mancanza di rimorsi.  
D Un senso di autostima grandioso, mancanza di empatia e bisogno di ammirazione.
- 14) **Il Core-Om è:**  
A Una lista di item dell'ICF, rilevanti per condizioni di salute e contesti di cura specifici, selezionati dall'insieme dell'ICF, seguendo un approccio scientifico basato su studi psicometrici e il coinvolgimento di esperti.  
B Un questionario di personalità analogo al MMPI 2 ma tarato per la fascia adolescenziale.  
C Un test per indagare sulla presenza di disturbi di personalità.  
D Un questionario che può essere utilizzato per la valutazione di efficacia degli interventi.
- 15) **La scala HoNOS:**  
A E' uno test di personalità analogo al MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory), per valutare eventuali disturbi psicopatologici.  
B E' una scala per misurare il rischio di sviluppare una depressione post-partum.  
C E' uno strumento di valutazione dei risultati del trattamento dei disturbi mentali in soggetti adulti che sono in contatto con i servizi psichiatrici.  
D E' uno strumento specifico per valutare l'efficacia delle psicoterapie.
- 16) **Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura:**  
A E' parte integrante della struttura ospedaliera, dalla cui direzione dipende ed è collegato solo funzionalmente al CSM al quale invia i pazienti dopo il ricovero.  
B E' parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale.  
C E' una struttura ospedaliera dove possono effettuati solo Trattamenti Sanitari Obbligatori.  
D E' un reparto ospedaliero appartenente al Dipartimento di Medicina.
- 17) **Nei test di Wechsler il subtest Ripetizione di Cifre misura particolarmente:**



Pagina 2 di 4

- A La memoria procedurale.
- B La memoria episodica.
- C La memoria semantica.
- D La memoria di lavoro.

18) **Un QI di 85 corrisponde a:**

- A Un punteggio medio ai subtest di Wechsler di 5.
- B Rango percentile di 10.
- C - 1,5 punti Z.
- D - 1 punto Z.

19) **In caso che il percorso adottivo abbia esito positivo nella formula dell'adozione non legittimante:**

- A Il figlio mantiene il proprio cognome d'origine, che verrà posposto a quello dei genitori adottivi.
- B Il figlio non mantiene obblighi nei confronti della propria famiglia d'origine.
- C Il figlio stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva.
- D Il figlio non diventa erede dei genitori adottivi.

20) **Le competenze elementari che l'approccio capacitante si propone di riconoscere e tener vive nell'anziano, anche in caso di compromissione delle funzioni cognitive sono:**

- A La competenza a parlare, la competenza a comunicare, la competenza emotiva, la competenza a contrattare, la competenza a decidere.
- B La competenza a comunicare.
- C La competenza a decidere.
- D La competenza emotiva.

21) **Chi tra i seguenti autori ha validato e manualizzato un modello di trattamento delle dipendenze da cocaina:**

- A M.M. Linehan.
- B O.F. Kernberg.
- C G.A. Marlatt.
- D K.M. Carroll.

22) **Nei percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita, l'intervento dello psicologo:**

- A È previsto dai LEA solo se richiesto dal ginecologo.
- B È previsto dai LEA.
- C È previsto dai LEA solo se richiesto dal medico di base con prescrizione su ricetta rossa.
- D Non è previsto dai LEA.

23) **Con riferimento al DSM-5, fra i criteri per la diagnosi di schizofrenia sono previsti:**

- A Almeno un sintomo caratteristico, oltre a segni prodromici attenuati di malattia con calo del funzionamento lavorativo per almeno 3 mesi con una settimana con sintomi attivi.
- B Deliri e allucinazioni di carattere visivo per almeno 3 mesi, in assenza di sintomi di eccitamento.
- C Almeno due sintomi caratteristici per almeno 6 mesi, oltre a segni prodromici attenuati di malattia con calo del funzionamento sociale, lavorativo o della cura di sé per un minimo di 6 mesi di cui almeno uno con sintomi attivi.
- D Delirio di grandezza o allucinazioni uditive senza calo del funzionamento sociale e lavorativo.

24) **Il PUA e l'UVMD sono:**

- A Il Progetto di Utilità Assistenziale elaborato dall'Unità Valutativa Multidisciplinare Dipartimentale per i percorsi di recovery nel trattamento dalla grave patologia mentale fondato sulla possibilità di superare il trauma della malattia, le conseguenze dei trattamenti e spesso dei mal-trattamenti, la perdita delle capacità e delle opportunità di accesso ad attività che hanno un significativo valore personale.
- B Il Piano Unitario di Assistenza e l'Unità di Valutazione Multifattoriale delle Dipendenze previsti dal Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM)
- C Il Punto Unico di Accesso e l'Unità valutativa Multidimensionale Distrettuale sono strutture previste dalla Legge 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito dei Piani di Zona, elaborati dal Distretto Sociosanitario e, in particolare, dall'Ufficio di Piano al fine di garantire i LIVEAS.
- D Il Punto Unico di Accesso e l'Unità valutativa Multidimensionale Distrettuale che rappresentano, insieme al Piano di Assistenza Individuale e al Case Manager, le articolazioni fondamentali di una modalità organizzativa di accesso unitario e universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, rivolta in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

25) **Il DSM-5 individua tre criteri necessari per effettuare una diagnosi di Disabilità Intellettiva: il primo è il Deficit delle funzioni intellettive. Quali sono gli altri due?**





- A Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale; presenza di malformazioni o lesioni cerebrali acquisite.
- B Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale; deficit nelle abilità comunicative e sociali.
- C Deficit nelle abilità comunicative e sociali; esordio dei deficit intellettivi e comunicativi durante il periodo di sviluppo.
- D Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale; esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il periodo di sviluppo.

---

26) **Al MMPI-2 la configurazione che indica con maggiore probabilità "dissimulazione" o "minimizzazione" è:**

- A F >90; L e K nella norma o tendenzialmente basse; tutte le scale cliniche elevate.
- B L e K elevate (>65), bassa F (<40), tutte le scale cliniche <50.
- C L e K >65 e F - K >12.
- D L <65, F >65, K <65.

---

27) **Nelle Scale Wechsler punteggi grezzi di tutti i sub test vengono trasformati in punteggi ponderati aventi:**

- A Media 10 e deviazione standard 1,5.
- B Media 100 e deviazione standard 15.
- C Media 10 e deviazione standard 3.
- D Media 10 e deviazione standard 5.

---

28) **Per Primo soccorso psicologico (OMS) in situazioni emergenziali si intende:**

- A Un protocollo utilizzato in situazioni emergenziali, individuali e di comunità, che può essere erogato anche da operatori formati non psicologi.
- B Un protocollo utilizzato in situazioni emergenziale erogato individualmente da operatori formati non psicologi.
- C Un intervento rivolto all'équipe in seguito ad eventi stressanti erogato da professionisti psicologi.
- D Un intervento diretto alla persona che ha vissuto un evento stressante erogato da professionisti psicologi.

---

29) **Quali traiettorie evolutive per i DSA?**

- A La dislessia tende a migliorare mentre la scrittura e la matematica peggiorano.
- B La maggior parte dei DSA rimane allo stesso livello nelle prove specifiche di lettura, scrittura anche se ha effettuato un trattamento.
- C Nella maggior parte dei casi c'è una compensazione del disturbo specifico dell'apprendimento anche a fronte di un trattamento riabilitativo, pochi casi non migliorano e frequentemente presentano comorbidità con disturbi della sfera emotivo-relazionale.
- D Solo una piccola parte dei DSA migliora e la maggior parte peggiora.

---

30) **Per quanto riguarda l'utilizzo delle scale Vineland Adaptive Behaviour Scale (VABS) for Children quale di questi sottodomini NON è misurato nel dominio "Socializzazione":**

- A Comportamenti problema.
- B Gioco e tempo libero.
- C Regole sociali.
- D Relazioni interpersonali.

