

1. Quale fattore influenza maggiormente il recupero della miopia da privazione di forme?

- A. Tutte le precedenti
- B. Il tempo di permanenza della privazione
- C. L'entità della miopia raggiunta
- D. L'età del soggetto

2. La miopia è considerata elevata per valori di equivalente sferico:

- A. Maggiore di 6 D
- B. Maggiore di 5 D
- C. Maggiore di 7 D
- D. Maggiore di 8 D

3. Il cristallino è:

- A. Una lente asferica
- B. Una lente biconvessa
- C. Una lente menisco
- D. Una lente biconvessa e menisco

4. Diagnosi differenziale tra strabismo concomitante e paralitico concomitante:

- A. Differenza di angolo tra deviazione primaria e secondaria
- B. Alterazioni di movimento di duzioni e versioni
- C. Variazione dell'entità della deviazione nelle varie posizioni di sguardo
- D. Tutte le precedenti

5. Nelle paralisi muscolari la Pac ha lo scopo di:

- A. Eliminare la diplopia
- B. Compensare un deficit campimetrico
- C. Conservare la collaborazione binoculare
- D. Compensare ametropie refrattive

6. L'istallazione di un cicloplegico in soggetti che presentano una camera anteriore molto bassa può provocare:

- A. Blefarocongiuntivite allergica
- B. Intossicazione generale

11. Il piano di Listing è

- A. l'asse intorno a cui ruota l'occhio
- B. il piano equatoriale immaginario che passa attraverso il centro di rotazione del bulbo
- C. la distanza tra il punto tangenziale T e il punto I al centro dell'inserzione anatomica del muscolo
- D. nessuna delle alternative è valida

12. Quando si ha uno spostamento del bulbo oculare in avanti rispetto al margine orbitario, lungo un asse sagittale dell'orbita senza dislocazioni laterali, verticali, oblique, si ha un esoftalmo

- A. assiale
- B. eccentrico
- C. assoluto
- D. relativo

13. L'anisoforia ottica è

- A. una foria intermittente
- B. la differenza tra le due rime palpebrali
- C. una correzione uguale tra i due occhi
- D. quando i due occhi, corretti con potere differente, ottengono la visione binoculare solo mediante un'attività delle vergenze fusionali di entità diversa nelle varie posizioni di sguardo

14. Il nistagmo oculare si differenzia da quello vestibolare

- A. perché rivela scosse a fase lenta e rapida
- B. perché rivela scosse di tipo pendolare di eguale ampiezza
- C. perché aumenta la frequenza in convergenza
- D. perché diminuisce di frequenza in divergenza

15. Per misurare l'ampiezza delle DVD con il metodo di Bielschowsky occorre

- A. occlusore traslucido e stecca dei filtri rossi
- B. occlusore traslucido
- C. stecca dei filtri rossi
- D. qualsiasi tipo di occlusore

The bottom of the page features handwritten text. On the left, there is a signature that appears to be 'Ber' followed by a stylized flourish. To the right of this, there are the initials 'DA' written in a bold, blocky font.

PROVA SCRITTA 2

Dr. P. B. / L. G. /

17. Il torcicollo oculare è un atteggiamento compensatore di
- A. diplopia monoculare
 - B. diplopia binoculare
 - C. confusione
 - D. nessuna delle precedenti
18. La paralisi della convergenza
- A. rientra nelle paralisi di sguardo sopra nucleare
 - B. non interessa i movimenti oculari di vergenza
 - C. nella visione lontana i movimenti non sono possibili in tutte le direzioni di sguardo
 - D. nella visione vicina c'è la convergenza
19. Nella Duane I
- A. è presente limitazione dell'adduzione
 - B. è presente abduzione normale
 - C. è presente restringimento della fessura palpebrale e retrazione in adduzione
 - D. nessuna delle precedenti
20. L'esotropia essenziale infantile
- A. ha inizio tra la nascita e 6 mesi di età
 - B. presenta un grande angolo di deviazione
 - C. si può associare a deficit di abduzione
 - D. Tutte le precedenti
21. Il muscolo meno interessato dalla miopia endocrina è
- A. il muscolo retto superiore
 - B. retto inferiore
 - C. retto mediale
 - D. retto laterale
22. Nel fenomeno di Marcus-Gunn si verifica un'anomalia dell'occhio in seguito a:

27. Nel cheratocono compare

- A. astigmatismo irregolare
- B. astigmatismo regolare
- C. astigmatismo misto
- D. nessuna delle precedenti

28. In quale periodo della gestazione la rosolia può provocare l'insorgenza di cataratta

- A. nella prima settimana
- B. dalla seconda alla decima settimana
- C. dalla quindicesima alla trentesima settimana
- D. dalla decima alla quindicesima settimana

29. In pazienti con una neurite ottica acuta, quale delle seguenti affermazioni è corretta

- A. normale l'aspetto della papilla ottica
- B. normale la risposta pupillare alla luce
- C. normali i pev
- D. normale la visione dei colori

30. La neurite ottica retrobulbare implica generalmente

- A. caduta del visus centrale
- B. amaurosi
- C. restringimento concentrico del campo visivo
- D. nessuna delle precedenti

