

non
Esuava

[Handwritten signature]

Prova pratica 3

6. Nella sindrome dell'occhio pesante l'anomalia della motilità è:

- A. Exotropia e ipotropia
- B. Esotropia e ipertropia
- C. Exotropia e ipertropia
- D. Esotropia e ipotropia

7. L'angolo K è:

- A. L'angolo che si forma tra l'asse pupillare centrale e la linea principale di visione
- B. L'angolo che si forma tra l'asse di fissazione e l'asse visivo
- C. L'angolo che si forma tra l'asse pupillare centrale e l'asse ottico
- D. Nessuna delle precedenti

8. Il decentramento di una lente oftalmica negativa produce:

- A. Effetto prismatico utilizzato nella correzione della miopia con alterazioni della motilità oculare
- B. Effetto prismatico non misurabile pur conoscendo il potere della lente e l'entità del decentramento
- C. Diminuzione del potere effettivo della lente
- D. Tutte le precedenti

9. Come si calcola il rapporto AC/A:

- A. $\Delta 1 - \Delta / D$
- B. $\Delta - \Delta 1 / D$
- C. $D / \Delta 1 - \Delta$
- D. Nessuna delle precedenti

10. Nella DVD:

- A. Non c'è diplopia
- B. C'è diplopia solo quando fissa l'occhio soppresso
- C. C'è diplopia quando fissa l'occhio fissatore
- D. C'è sempre diplopia

[Handwritten signature]

CSL
Breve

Prova pratica 3



1. Quale delle seguenti affermazioni a proposito del pucker maculare non è corretta
 - A. è una membrana fibrocellulare avascolare che prolifera sulla superficie retinica interna
 - B. crea trazione tangenziale sulla macula
 - C. causa perdita della visione centrale con o senza metamorfopsie
 - D. è caratterizzato da emorragie sottoretiniche

2. La schiascopia è una metodica volta a
 - A. osservare il fondo oculare
 - B. effettuare un esame obiettivo del grado di rifrazione
 - C. rilevare opacità dei mezzi diottrici
 - D. effettuare un esame del circolo venoso retinico

3. Le tavole a progressione LogMAR
 - A. hanno una progressione uguale per ogni riga e pari al logaritmo dell'angolo di minima risoluzione
 - B. hanno una progressione delle dimensioni degli stimoli pari all'inverso dell'angolo visuale
 - C. non consentono di esprimere piccole variazioni della vista
 - D. hanno una progressione che si basa su scala geometrica

4. A cosa si associa l' head nodding:
 - A. Al nistagmo pendolare nello spasmo nutans nella forma incompleta
 - B. Al nistagmo pendolare nello spasmo nutans nella forma completa
 - C. Al nistagmo latente
 - D. Al nistagmo dell'ambliopia

5. Quando è positivo il test di Bielschowsky:
 - A. Testa inclinata su lato sano l'occhio affetto compie un definito movimento di elevazione
 - B. Testa inclinata lato paretico l'occhio affetto compie un definito movimento di elevazione
 - C. Testa inclinata lato paretico l'occhio affetto compie un definito movimento di abbassamento
 - D. inclinata lato sano l'occhio affetto compie un definito movimento di abbassamento

