



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)

Rev. 0
del 07/11/2016

Pag.1 di 1

MISURE PREVENTIVE INTRA-OPERATORIE

TAB.PGCC-ICA02/1

MISURE INTRA-OPERATORIE

(Per maggiori approfondimenti far riferimento Regolamento del Blocco Operatorio Centralizzato del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti)

Adeguati
sistemi di
ventilazione

Sistema di ventilazione

- **Tenere chiuse le porte delle sale operatorie**, tranne che per consentire il passaggio del personale, dei pazienti e delle attrezzature.
- Le porte chiuse, servono anche, per mantenere l'areazione della sala operatoria a pressione positiva rispetto ai corridoi ed alle stanze adiacenti.
- **Limitare allo stretto necessario il numero di personale** che entra in sala operatoria.

Adeguate pulizie
e disinfezione
ambiente

Pulizie e disinfezione delle superfici ambientali

- **In caso di contaminazione di sangue o di altri liquidi biologici** in maniera visibile, **pulire le aree interessate** secondo protocollo, **prima del successivo intervento**.
- Non usare tappetini adesivi all'entrata delle sale operatorie.
- **Pulire ad umido ed aspirare il pavimento delle sale operatorie dopo l'ultimo intervento** del giorno o della notte con disinfettante.

Campionamento
microbiologico
ambientale

Campionamento microbiologico ambientale

- **Non effettuare campionamento di routine**, ma ottenere campioni ambientali dell'aria e delle superfici della sala operatoria **solo nel contesto di specifiche indagini epidemiologiche**.

Adeguate
sterilizzazione
strumenti
chirurgici

Sterilizzazione degli strumenti chirurgici

- **Sterilizzare tutti gli strumenti chirurgici secondo protocolli appropriati**.
- **Effettuare la sterilizzazione lampo solo in caso di emergenza**.

Abbigliamento
chirurgico e
telerie

Abbigliamento chirurgico e teleria

- **All'ingresso della sala operatoria indossare una mascherina che copra adeguatamente bocca e naso, una cuffia o copricapo per coprire capelli e barba**.
- Non indossare soprascarpe allo scopo di prevenire ISC.
- Effettuare lavaggio accurato delle mani ed indossare guanti sterili dopo aver indossato il camice sterile.
- **Usare camici e teli che mantengono efficacia di barriera anche quando bagnati**.
- **Cambiare la divisa chirurgica se visibilmente sporca o contaminata con sangue o altro materiale**.

Rispetto
dell'asepsi e
adeguate
tecniche
chirurgiche

Asepsi e tecniche chirurgiche

- **Rispettare le norme di asepsi quando si posizionano catetere vascolare, cateteri da anestesia spinale o epidurale o quando si somministrano farmaci per via endovenosa**.
- **T trattare i tessuti in modo non traumatico**, mantenere un'emostasi efficace, rimuovere i tessuti devitalizzati e i corpi estranei dal sito chirurgico.
- **Posticipare la chiusura della ferita o lasciare l'incisione aperta, per portarla a guarigione «per seconda intenzione» quando il sito chirurgico è pesantemente contaminato**.
- **Se necessario un drenaggio utilizzare un drenaggio con sistema ad aspirazione chiusa, posizionarlo attraverso una incisione separata e distante dalla incisione chirurgica e rimuovere il drenaggio appena possibile**.

Rispetto Azioni
Bundle

Azioni previste dal Bundle ISC nelle fase perioperatoria

- **Contenimento del calo della temperatura corporea del paziente durante l'intervento chirurgico;**
- **Monitoraggio della glicemia del paziente durante e dopo l'intervento chirurgico.**