MISURE PRE-OPERATORIE

(Per maggiori approfondimenti *far riferimento Regolamento del Blocco Operatorio Centralizzato del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti*

Adeguata preparazione del paziente

Preparazione del Paziente

- Limitare le giornate di degente pre operatoria.
- Identificare e **trattare tutte le infezioni** prima degli interventi elettivi e posticipare l'intervento fino alla risoluzione dell'infezione
- **Evitare la tricotomia** a meno che i peli nell'area di incisione non interferiscano con l'intervento (azione bundle)
- Se la tricotomia è necessaria eseguirla immediatamente prima dell'intervento e preferibilmente utilizzando rasoi elettrici
- **Controllare la glicemia** in tutti i pazienti diabetici ed evitare iperglicemia nel periodo perioperatorio
- Incoraggiare la **cessazione del fumo** o almeno l'astinenza nei 30 giorni precedenti l'intervento
- **Somministrare ai pazienti chirurgici gli emoderivati ove indicato**
- Far eseguire al paziente una **doccia o un bagno con antisettico** almeno la notte prima dell'intervento
- **Lavare e pulire accuratamente l'area dell'incisione** per rimuovere le macro contaminazioni prima della disinfezione del campo operatorio
- Utilizzare un'appropriata preparazione antisettica per la cute
- Igiene del cavo orale**: nel paziente digiuno si verifica un aumento di batteri del cavo orale che possono essere trasferiti nelle vie respiratorie durante l'intubazione endotracheale, a tale scopo è bene procedere alla rimozione delle protesi mobili e al lavaggio dei denti e a sciacqui con collutorio antisettico.**

Adeguata preparazione dell'equipe Chirurgica

Preparazione dell'equipe chirurgica

- Tenere le **unghie corte** ed evitare l'uso di unghie artificiali
- Effettuare il **lavaggio chirurgico con antisettico per 2-5 minuti** e lavare mani e avambracci fino ai gomiti
- Dopo essersi lavati **tenere braccia e mani in alto** e lontane dal corpo in modo da far scolare l'acqua dalle dita verso i gomiti, **asciugare con un telo sterile** e indossare guanti e camice sterili precedenti l'intervento
- **Somministrare ai pazienti chirurgici gli emoderivati ove indicato**

Profilassi antibiotica

Profilassi antibiotica (Azione Bundle)

- La profilassi antibiotica deve essere iniziata immediatamente prima delle manovre anestesiologiche
- In caso di interventi di durata superiore alle 2-4 ore, la maggior parte delle linee guida, suggerisce di somministrare una dose intraoperatoria se l'operazione è ancora in corso dopo un tempo dall'inizio dell'intervento pari al doppio dell'emivita del farmaco impiegato
- Nel caso in cui le raccomandazioni della linea guida non vengano rispettate (mancata somministrazione di una profilassi antibiotica suggerita ovvero somministrazione di una profilassi non indicata dalle linee guida) **i motivi di tale comportamento dovrebbero essere chiaramente riportati nella cartella clinica.**