

 <p>REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>	Rev.0	Tab.PGCC-ICA01/3
		SCHEDA 3 CHIRURGIA GENERALE	

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
<p><b>MAMMELLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodulesctomia</li> <li>- Chirurgia oncologica</li> <li>- Mammoplastica riduttiva</li> </ul> <p><b>ERNIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riparazione di ernia inguinale senza utilizzo di materiale protesico</li> <li>- Chirurgia laparoscopica dell'ernia senza utilizzo di materiale protesico</li> </ul> <p><b>ALTRI INTERVENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laparoscopia diagnostica e/o lisi di aderenze</li> <li>- Biopsia escissionale di struttura linfatica superficiale</li> <li>- Chirurgia laparoscopica per reflusso gastroesofageo</li> </ul>	<p>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</p> <p>Se</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>si prevede che l'intervento sia di lunga durata</li> </ol> <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>punteggio ASA è <math>\geq 3</math>:</li> </ol> <p><b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b></p>	<p>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</p> <p>Se lo si ritiene fortemente necessario : <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b></p>
<p><b>LAPAROCELE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione di laparocele</li> </ul> <p><b>MAMMELLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammoplastica additiva</li> <li>- Impianto di espansore/protesi</li> </ul> <p><b>ERNIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riparazione di ernia inguinale con utilizzo di materiale protesico</li> <li>- Chirurgia laparoscopica dell'ernia con utilizzo di materiale protesico</li> </ul>	<p>Somministrare : <b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b></p> <p>Valutazioni: Dose intraoperatoria per interventi di <b><u>durata superiore a 3h</u></b></p>	<p>Somministrare : <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b></p>
<p><b>STOMACO/INTESTINO TENUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgia dello stomaco di elezione</li> <li>- Chirurgia del duodeno, del tenue, di elezione</li> </ul> <p><b>ESOFAGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgia esofagea con ricostruzione gastrica</li> </ul>	<p>Somministrare : <b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b></p> <p>Valutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3h</li> <li>- Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h</li> </ul>	<p>Somministrare : <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b></p>
<p><b>FEGATO/VIE BILIARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colectomia laparoscopica non complicata</li> </ul>	<p>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</p> <p>Se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>punteggio ASA è <math>\geq 3</math></li> <li>si utilizza materiale protesico</li> </ol> <p><b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b></p>	<p>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</p> <p>Se lo si ritiene fortemente necessario : <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b></p>

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE <b>ASL RIETI</b>	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)		Rev.0 11/04/2016	Tab.PGCC-ICA01/3
	<b>SCHEDA 3</b> <b>CHIRURGIA GENERALE</b>			

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
<b>FEGATO/VIE BILIARI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colectomia per via laparotomica</li> <li>- Calcolosi della via biliare principale</li> <li>- Colectomia video laparoscopica complicata (da colecistite, ittero, pancreatite, immunodeficienza, presenza di protesi biliari ecc.)</li> <li>- Chirurgia biliare aperta</li> <li>- Chirurgia epatica resettiva</li> <li>- Chirurgia pancreaticca</li> </ul>	Somministrare : <u><b>Cefazolina 2 g EV</b></u> <u><b>+ Metronidazolo 500 mg</b></u>  oppure : <u><b>Gentamicina 1,5 mg /kg</b></u> <u><b>EV</b></u> <u><b>+ Clindamicina 600 mg o</b></u> <u><b>Metronidazolo 500 mg</b></u>  Valutazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dose intraoperatoria per interventi di <b>durata superiore a 3h</b></li> <li>- Somministrazioni ulteriori di antibiotico <b>entro le 24 ore</b></li> </ul>	Somministrare :  <u><b>Gentamicina 1,5 mg /kg</b></u> <u><b>EV</b></u> <u><b>+ Clindamicina 600 mg o</b></u> <u><b>Metronidazolo 500 mg</b></u>
<b>COLON</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgia coloretale</li> <li>- Appendicectomia</li> <li>- Ricanalizzazione intestinale</li> </ul> <b>ESOFAGO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgia esofagea con ricostruzione colica</li> </ul>	Somministrare : <u><b>Cefazolina 2 g EV</b></u> <u><b>+ Metronidazolo 500 mg</b></u>  oppure : <u><b>Gentamicina 1,5 mg /kg</b></u> <u><b>EV</b></u> <u><b>+ Clindamicina 600 mg o</b></u> <u><b>Metronidazolo 500 mg</b></u>  Valutazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dose intraoperatoria per interventi di <b>durata superiore a 3h</b></li> <li>- Somministrazioni ulteriori di antibiotico <b>entro le 24 ore</b></li> </ul>	Somministrare :  <u><b>Gentamicina 1,5 mg /kg</b></u> <u><b>EV</b></u> <u><b>+ Clindamicina 600 mg o</b></u> <u><b>Metronidazolo 500 mg</b></u>