

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)	
	SCHEDA 4 CHIRURGIA ORTOPEDICA I	

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
CHIRURGIA ORTOPEDICA SENZA PROTESI (ELETTIVA) <ul style="list-style-type: none"> - Asportazione/sutura/incisione di lesione di muscoli, tendini e fasce della mano, altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo/ sottocutaneo - Altri interventi di riparazione, sezione o plastica su muscoli, tendini e fasce - Meniscectomia artroscopica - Sinoviectomia artroscopica 	Di norma: <u>nessuna profilassi antibiotica</u> Se: punteggio <u>ASA è ≥3</u> <u>Cefazolina 2 g EV</u>	Di norma: <u>nessuna profilassi antibiotica</u> Se lo si ritiene fortemente necessario : <u>Clindamicina 600 mg EV</u>
CHIRURGIA ORTOPEDICA CHE COINVOLGA UNA O PIÙ ARTICOLAZIONI <ul style="list-style-type: none"> - Chirurgia osteoarticolare non protesica (osteotomie, 20spostosi, cisti ossee) - Ricostruzione di LCA ginocchio - Sinoviectomia con artrotomia - Artrodesi del piede o della caviglia 	Somministrare : <u>Cefazolina 2 g EV</u> Valutazioni : <ul style="list-style-type: none"> - Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h 	Somministrare : <u>Clindamicina 600 mg EV</u>
CHIRURGIA DEL RACHIDE ARTROPROTESI <ul style="list-style-type: none"> - Anca - Ginocchio - Altre protesi 	Somministrare : <u>Cefazolina 2 g EV</u> Oppure In presenza di: <ul style="list-style-type: none"> - colonizzazione/infezione da MRSA non eradicata - paziente proveniente da realtà dove le infezioni da MRSA sono frequenti considerare (caso per caso) l'opportunità di somministrare un glicopeptide : <u>Vancomicina (1 g da infondere in 1 ora e terminare prima dell'inizio dell'intervento)</u> Valutazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3h - Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h 	Somministrare: <u>Vancomicina (1 g da infondere in 1 ora e terminare prima dell'inizio dell'intervento)</u>

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)	
	SCHEDA 4 CHIRURGIA ORTOPEDICA I	Rev.0 11/04/2016

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
FISSAZIONE DI FRATTURA CHIUSA - Gesso e sintesi percutanea - Applicazione di mezzi di sintesi - Applicazione di fissatore esterno - Fratture esposte di grado 1, 2 gestite entro 6 ore dal trauma - Artrodesi del piede o della caviglia - Rimozione di mezzi di sintesi	Somministrare : <u>Cefazolina 2 g EV</u> Valutazioni : Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h	Somministrare : <u>Clindamicina 600 mg EV</u>
CHIRURGIA SU POLITRAUMATIZZATI Qualsiasi tipo di sintesi o di frattura su politraumatizzati provenienti dalla rianimazione già trattati con antibiotici, ma senza infezione in atto	Somministrare : <u>Vancomicina</u> <u>(1 g da infondere in 1 ora</u> <u>e</u> <u>terminare prima dell'inizio</u> <u>dell'intervento)</u> Valutazioni: Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h	