

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE <b>ASL RIETI</b>	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)	 <b>REGIONE LAZIO</b>	Rev. 0 11/04/2016	Tab.PGCC-ICA01/6
	<b>SCHEDA 6</b> <b>CHIRURGIA UROLOGICA</b>			

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
<b>INTERVENTI SUL TESTICOLO</b> - Idrocele - Varicocele - Orchidopessi - Orchiectomia <b>ALTRI INTERVENTI</b> - Cisti dell'epididimo - Fimosi - Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)	Di norma: <b><u>nessuna profilassi antibiotica</u></b>  Se: punteggio <b><u>ASA è ≥3</u></b>  <b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b>	Di norma: <b><u>nessuna profilassi antibiotica</u></b>  Se lo si ritiene fortemente necessario :  <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b>
<b>INTERVENTI SUL RENE</b> - Nefrotomia - Nefrostomia - Nefrectomia <b>INTERVENTI PER CALCOLOSI</b> - Litotripsia con onde d'urto	Somministrare : <b><u>Cefazolina 2 g EV</u></b>  Valutazioni: Dose intraoperatoria per interventi di <b><u>durata superiore a 3h</u></b>	Somministrare : <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b>
<b>DIAGNOSTICA UROLOGICA</b> - Agobiopsia prostatica transrettale	Somministrare per <b><u>os:</u></b>  1. <b><u>Ciprofloxacina 500 mg 12h prima</u></b> della biopsia, 2. <b><u>500 mg al momento</u></b> della biopsia 3. <b><u>500 mg 12h dopo</u></b> la biopsia	Somministrare :  <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b> + <b><u>Gentamicina 1,5 mg/Kg</u></b>
<b>INTERVENTI SULLA PROSTATA</b> - Resezione trans uretrale di prostata(TUR-P) - Adenomectomia trans vescicale (ATV) - Prostatectomia radicale <b>INTERVENTI SULL'URETERE</b> - Interventi sulla via escrettrice superiore - Pieloplastiche <b>INTERVENTI SULL'URETRA</b> - Uretrotomia endoscopica <b>INTERVENTI SULLA VESCICA</b> - Resezione transuretrale di tumori vescicali - Altri interventi sulla vescica	Somministrare :  <b><u>Cefoxitina 2 g EV</u></b> se l'urinocoltura è negativa  <b>NB:</b> Escludere sempre, prima dell'intervento, l'eventuale presenza di colonizzazione/infezione e in caso positivo eradicare l'infezione prima di eseguire l'intervento  Valutazioni: - Dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3h - Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h	Somministrare :  <b><u>Clindamicina 600 mg EV</u></b> + <b><u>Gentamicina 1,5 mg/Kg</u></b>
<b>INTERVENTI SULLA VESCICA</b> - Cistectomia con apertura dell'intestino	- Preparazione intestinale - Somministrare : <b><u>Gentamicina 1,5 mg /kg EV</u></b> + <b><u>Clindamicina 600 mg</u></b> o <b><u>Metronidazolo 500mg</u></b>	Somministrare <b><u>Gentamicina 1,5 mg /kg EV</u></b> + <b><u>Clindamicina 600 mg</u></b> o <b><u>Metronidazolo 500mg</u></b>