

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)		
	SCHEDA 1 CHIRURGIA CARDIACA CHIRURGIA VASCOLARE	Rev. 0 11/04/2016	Tab.PGCC-ICA01

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
CHIRURGIA VASCOLARE - Varici - Interventi su carotide senza materiale protesico - Gangliectomia - Disostruzione arteriosa (Fogarty)	Di norma: nessuna profilassi antibiotica Se punteggio ASA è ≥ 3 Cefazolina 2 g EV	Di norma: nessuna profilassi antibiotica Se lo si ritiene fortemente necessario : Clindamicina 600 mg EV
CHIRURGIA CARDIACA - Inserzione di pacemaker definitivo - Inserzione di defibrillatore	Somministrare : Cefazolina 2 g EV	Somministrare : Clindamicina 600 mg EV
CHIRURGIA CARDIACA - Bypass aorto-coronarico - Protesi valvolari	Somministrare : Cefazolina 2 g EV	Somministrare : Clindamicina 600 mg EV
CHIRURGIA VASCOLARE - Interventi sulla carotide con utilizzo di materiale protesico - Chirurgia vascolare arteriosa in sede addominale e dell'arto inferiore Impianto di endoprotesi aortica	Somministrare : Cefazolina 2 g EV Valutazioni: - Dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3 ore - Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h	Somministrare : Clindamicina 600 mg EV Se impianto di materiale protesico: Vancomicina (15 mg /Kg dose massima 1 gr) da infondere in 1 ora e terminare prima dell'inizio dell'intervento
CHIRURGIA VASCOLARE - Amputazione di arto inferiore(in assenza di infezione in atto)	Somministrare : Clindamicina 600 mg EV + Gentamicina 1,5 mg / kg	