TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
CHIRURGIA DELL'ORECCHIO PULITA - Miringoplastica - Timpanoplastica CHIRURGIA DI NASO, SENI NASALI, PARANASALI - Settoplastiche/rinosettoplastiche CHIRURGIA DELLE TONSILLE - Adenotonsillectomia CHIRURGIA DI TESTA E COLLO PULITA - Tiroidectomia totale/parziale - Paratiroidectomia - Linfoadenectomie - Svuotamenti laterocervicali sottomascellari elettivi	**Di norma: nessuna profilassi antibiotica** **Se punteggio ASA è ≥3 Cefazolina 2 g EV**	**Di norma: nessuna profilassi antibiotica** **Se lo si ritiene fortemente necessario : Clindamicina 600 mg EV**
CHIRURGIA DELL'ORECCHIO, PULITA-CONTAMINATA O CONTAMINATA - Otoneurochirurgia - Timpanoplastiche - Chirurgia dell'otosclerosi CHIRURGIA DI NASO, SENI NASALI, PARANASALI - Intervento contaminato in endoscopia attraverso naso, seni paranasali, orofaringe CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO, PULITA CONTAMINATA E CONTAMINATA - Chirurgia oncologica del massiccio facciale - Lembi - Fistole rinoliquorali	**Somministrare :** Cefazolina 2 g EV + Clindamicina 600 mg o Metronidazolo 500 mg **Valutazioni :** - Dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3 ore - Somministrazioni di ulteriori dosi di antibiotico entro le 24h	**Somministrare:** **Gentamicina 1,5 mg / kg EV + Clindamicina 600 mg o Metronidazolo 500 mg**