

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)	
	SCHEDA 8 INSERZIONE CVC-PORT-A-CATH	Rev. 0 11/04/2016

L'inserzione di un CVC è da considerare chirurgia pulita e pertanto non richiede profilassi antibiotica.

Si ritiene possa essere utile una profilassi antibatterica sistemica peri-inserzione **solo** nelle seguenti situazioni:

- Inserzione di CVC in paziente neutropenico e/o gravemente piastrinopenico.
- Pazienti che hanno già presentato infezioni del catetere.
- Condizioni locali di aumentato rischio infettivo perioperatorio.

Microrganismi coinvolti: S. aureus, S. epidermidis

TIPO DI INTERVENTO	ANITIBIOTICO	SE ALLERGIA AI BETA LATTAMICI
INTERVENTI di inserzione Port a Cath, CVC (in particolare neel seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - paziente neutropenico e/o gravemente piastrinopenico. - Pazienti che hanno già presentato infezioni del catetere. - Condizioni locali di aumentato rischio infettivo perioperatorio). 	Somministrare : Cefazolina 2 g EV	Somministrare : Clindamicina 600 mg EV