

1) CASO CLINICO

Sig.ra G. C - Nata a Roma il 30/07/1954

La paziente è stata sottoposta in data 01/10/2015 ad intervento chirurgico di Nefrectomia dx. EI: carcinoma renale a cellule chiare di grado 2 con focali necrosi coagulative. pT2a

Stadiazione: negativa.

Successivamente la paziente veniva avviata a programma di follow-up

16/10/2018 TC tb c/s MdC: “comparsa di almeno 9 nodulazioni solide in sede polmonare, distribuite ubiquitariamente, delle dimensioni massime di 11 mm da riferire a localizzazioni secondarie di malattia”

In considerazione dell'età, delle buone condizioni generali, dei dati di letteratura, in data 28/11/2018, iniziava trattamento di 1 linea con Tivozanib (Programma di uso terapeutico - Expanded Access Program).

Ultima TC tb c/s MdC effettuata in data 10/12/2023: “... rispetto al precedente (TC TB 11/09/2023) stabilità numerica e dimensionale delle lesioni polmonari, non recidiva nella sede della pregressa nefrectomia. Comparsa di lesione ossea distruttiva con presenza di tessuto molle al 1/3 superiore della diafisi omerale sx e lesione osteolitica di piccole dimensioni a livello di L1...”.

Paziente in PS 0-1 per algie scapolo-omerale a sx. Come procedi nell'iter-terapeutico?
